

Exercice 1

On considère d la droite passant par les points $A(0; -2; 1)$ et $B(3; 2; -1)$.

- 1) Déterminer une représentation paramétrique de la droite d .
- 2) Trouver deux autres points appartenant à la droite d .
- 3) Quelle est l'intersection de la droite d avec les plans $(O; \vec{i}, \vec{j})$, $(O; \vec{i}, \vec{k})$ et $(O; \vec{j}, \vec{k})$?

$$1) \text{ un vecteur de } d : \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3-0 \\ 2+2 \\ -1-1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$d \equiv \begin{cases} x = 0 + 3t \\ y = -2 + 2t \\ z = 1 - 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$2) \text{ Pour } t = -1 : \begin{cases} x = -3 \\ y = -4 \\ z = 2 \end{cases} \quad \text{Pour } t = 0 : \begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \\ z = 1 \end{cases}$$

D'où $C(-3; -4; 2) \in d$ | D'où $D(0; -2; 1) \in d$

$$3) * d \cap (O; \vec{i}; \vec{j}) \Leftrightarrow z = 0 \text{ et } z = 1 - 2t$$
$$\Leftrightarrow 0 = 1 - 2t$$
$$\Leftrightarrow t = \frac{1}{2}$$

$$\text{Pour } t = \frac{1}{2} : \begin{cases} x = \frac{3}{2} \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad d \cap \left\{ \left(\frac{3}{2}; 0; 0 \right) \right\}$$

$$* d \cap (O; \vec{i}; \vec{k}) \Leftrightarrow y = 0 \text{ et } y = -2 + 2t$$

$$\Leftrightarrow 0 = -2 + 2t$$

$$\Leftrightarrow 2 = 2t$$

$$\Leftrightarrow t = 1$$

$$\text{Pour } t = 1 : \begin{cases} x = -3 \\ y = 0 \\ z = -1 \end{cases}$$

$$d \cap \{(-3; 0; -1)\}$$

$$* d \cap (0; \vec{j}; \vec{k}) \Leftrightarrow x=0 \text{ et } x=3t$$

$$\Leftrightarrow 0=3t$$

$$\Leftrightarrow t=0$$

$$\text{Pour } t = \frac{1}{2}: \begin{cases} x=0 \\ y=-2 \\ z=1 \end{cases} \quad d \cap \{(0; -2; 1)\}$$

Exercice 2

On considère la droite d passant par les points $A(0; -2; 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-2; 3; -5)$.

- 1) Déterminer une représentation paramétrique de la droite d .
- 2) Trouver deux autres points appartenant à la droite d .
- 3) Quelles sont les coordonnées des éventuels points d'intersection de la droite d avec les plans $(0; \vec{i}, \vec{j})$, $(0; \vec{i}, \vec{k})$ et $(0; \vec{j}, \vec{k})$?

$$1) \quad d \equiv \begin{cases} x = 0 - 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 1 - 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$2) \quad \text{Pour } t=0: \begin{cases} x=0 \\ y=-2 \\ z=1 \end{cases} \quad \text{et pour } t=1: \begin{cases} x=-2 \\ y=1 \\ z=-4 \end{cases}$$

$$\text{D'où } B(0; -2; 1)$$

$$\text{D'où } C(-2; 1; -4)$$

3)

$$* d \cap (0; \vec{i}; \vec{j}) \Leftrightarrow z=0 \text{ et } z=1-5t$$

$$\Leftrightarrow 0=1-5t$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{1}{5}$$

$$\text{Pour } t = \frac{1}{5} : \begin{cases} x = -\frac{2}{5} \\ y = -\frac{7}{5} \\ z = 0 \end{cases}$$

$$d \cap \left\{ \left(-\frac{2}{5}; -\frac{7}{5}; 0 \right) \right\}$$

$$\textcircled{*} d \cap (0; \vec{i}; \vec{k}) \Leftrightarrow y = 0 \text{ et } y = -2 + 3t$$

$$\Leftrightarrow 0 = -2 + 3t$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{2}{3}$$

$$\text{Pour } t = \frac{2}{3} : \begin{cases} x = -\frac{4}{3} \\ y = 0 \\ z = -\frac{7}{3} \end{cases}$$

$$d \cap \left\{ \left(-\frac{4}{3}; 0; -\frac{7}{3} \right) \right\}$$

$$\textcircled{*} d \cap (0; \vec{j}; \vec{k}) \Leftrightarrow x = 0 \text{ et } x = -2t$$

$$\Leftrightarrow 0 = -2t$$

$$\Leftrightarrow t = 0$$

$$\text{Pour } t = 0 : \begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \\ z = 1 \end{cases}$$

$$d \cap \left\{ (0; -2; 1) \right\}$$

Exercice 3

Quelle est la nature géométrique de l'ensemble E défini par $\begin{cases} x = -3t \\ y = -2 + 3t \\ z = -t \end{cases}, t \in \mathbb{R} ?$

$$A(0; -2; 0)$$


vecteur normal de E : $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

L'ensemble E représente une droite du vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et qui pass par le point $A(0; -2; 0)$.

Exercice 4

On considère le cube $ABCDEFGH$ d'arête 1. Le point M est le milieu de l'arête $[AB]$. On choisit le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

- 1) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (MG) .
- 2) Quelles sont les coordonnées du point d'intersection de la droite (MG) avec le plan (ADE) ?



Exercice 5

1) $M(\frac{1}{2}; 0; 0)$ et $G(1; 1; 1)$

vecteur directeur de la droite (MG) : $\overrightarrow{MG} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Donc :
$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t \\ y = t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

2) $(MG) \cap ADE \Leftrightarrow x=0$ et $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t$

$$\Leftrightarrow 0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t$$

$$\Leftrightarrow t = -1$$

Donc : $(MG) \cap ADE \Leftrightarrow \{(0; -1; -1)\}$

Exercice 5

On considère la droite d définie par sa représentation paramétrique : $d: \begin{cases} x = -5t + 4 \\ y = -3 + 2t \\ z = 4t + 2 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

- 1) Quelles sont les coordonnées du point A appartenant à d de paramètre 1 ?
- 2) Déterminer un vecteur directeur \vec{u} de la droite d .
- 3) Est-ce que le vecteur $\vec{v}(-10; 4; 4)$ est aussi un vecteur directeur de la droite d ?
- 4) Existe-t-il un point B appartenant à d dont la cote est 2 ?
- 5) Est-ce que le point $C\left(\frac{3}{2}; -2; 4\right)$ appartient à la droite d ?

$$1) \text{ Pour } t=1: \begin{cases} x = -5 \cdot 1 + 4 \\ y = -3 + 2 \cdot 1 \\ z = 4 \cdot 1 + 2 \end{cases} = \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \\ z = 6 \end{cases}$$

Donc $A(-1; -1; 6)$

$$2) \text{ vecteur directeur de } d: \vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$3) \vec{v} \begin{pmatrix} -10 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ est un vecteur directeur de } d \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} \mid \vec{u} = k \cdot \vec{v}$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} \mid \begin{cases} -5 = k \cdot (-10) & \textcircled{1} \\ 2 = k \cdot 4 & \textcircled{2} \\ 4 = k \cdot 4 & \textcircled{3} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \Leftrightarrow k = \frac{1}{2}$$

Dans $\textcircled{3}$: $4 \neq \frac{1}{2} \cdot 4$ \nrightarrow impossible !

Donc, \vec{v} n'est pas un vecteur directeur de d .

$$4) B \in d \Leftrightarrow z = 2 \text{ et } z = 4t + 2$$

$$\Leftrightarrow 2 = 4t + 2$$

$$\Leftrightarrow t = 0$$

$$\text{Pour } t=0: \begin{cases} x = 4 \\ y = -3 \\ z = 2 \end{cases}$$

D'où $B(4; -3; 2)$

s) $C \in d$?

$$d \equiv \begin{cases} \frac{3}{2} = -5t + 4 & \textcircled{1} \\ -2 = -3 + 2t & \textcircled{2} \\ 4 = 4t + 2 & \textcircled{3} \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R}$$

$$\textcircled{3} \Leftrightarrow 4 = 4t + 2$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{1}{2}$$

Verifions dans $\textcircled{1}$: $-5 \cdot \frac{1}{2} + 4 = \frac{3}{2}$ ✓

verifions dans $\textcircled{2}$: $-3 + 2 \cdot \frac{1}{2} = -2$ ✓

Donc $C \in d$!