

Exercice 56

Déterminer une équation cartésienne du plan P défini par le point $A(-2; 0; 3)$ et de vecteurs directeurs $\vec{u}(-1; 2; 0)$ et $\vec{v}(-2; -3; 1)$.

$$\begin{aligned}\vec{u} \wedge \vec{v} &= \vec{i} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} &= \vec{i} (2 \cdot 1 - 0 \cdot (-3)) - \vec{j} (-1 \cdot 1 - 0 \cdot (-2)) + \vec{k} (-1 \cdot (-3) - 2 \cdot (-2)) \\ &= 2\vec{i} - (-1)\vec{j} + 7\vec{k} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal de P

P admet une équation cartésienne de la forme:

$$2x + y + 7z + d = 0, d \in \mathbb{R}$$

$$A \in P \Leftrightarrow 2 \cdot (-2) + 0 + 7 \cdot 3 + d = 0$$

$$\Leftrightarrow d = -17$$

$$\text{D'où } P \equiv 2x + y + 7z - 17 = 0$$

Exercice 57

Déterminer une équation cartésienne du plan P défini par le point $A(-1; 2; 5)$ et de vecteurs directeurs $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j}$ et $\vec{v} = \vec{j} + 2\vec{k}$.

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} & \vec{v} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \vec{u} \wedge \vec{v} &= \vec{i} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i} (2 - 0) - \vec{j} (2 - 0) + \vec{k} (1 - 0) \\ &= 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal de P .

Donc P admet une équation cartésienne de la forme:

$$-2x - 2y + z + d = 0, \quad d \in \mathbb{R}$$

$$A \in \mathbb{R} \Leftrightarrow -2 \cdot (-1) - 2 \cdot 2 + 5 + d = 0$$

$$\Leftrightarrow d = -3$$

$$D'où \quad P \equiv -2x - 2y + z - 3 = 0$$

Exercice 58

On considère les points $A(1; 1; 4)$, $B(-1; 1; 0)$, $C(-1; 0; 1)$ et $D(1; 0; 5)$.

- 1) Vérifier que $ABCD$ est un parallélogramme.
- 2) Calculer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AD}$.
- 3) En déduire l'aire de ce parallélogramme $ABCD$.

$$1) \quad ABCD \text{ est un parallélogramme} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

D'où $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $ABCD$ est un parallélogramme.

$$2) \quad \overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AD} = \vec{i} \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i}(-4) - \vec{j}(-2) + \vec{k}(2)$$

$$= \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$3) \quad \mathcal{A}_{ABCD} = \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AD}\|$$

$$= \sqrt{(-4)^2 + 2^2 + 2^2} \text{ u.a.}$$

$$= 2\sqrt{6} \text{ u.a.}$$

Exercice 59

On considère les points $A(-1; 1; 2)$, $B(0; 1; 1)$ et $C(1; 0; 3)$. Calculer l'aire du triangle ABC de deux façons différentes :

- 1) en calculant d'abord : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
- 2) en calculant d'abord : $\overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{BC}$.

$$1) \quad \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{AB} &= \vec{i} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= -1\vec{i} - 3\vec{j} - 1\vec{k} \\ &= \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{ABC} &= \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{1^2 + 3^2 + 1^2} \text{ u.a.} \\ &= \frac{\sqrt{11}}{2} \text{ u.a.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{BC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (0+1)\vec{i} - (-1-2)\vec{j} + (1-0)\vec{k} \\ &= \vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{ABC} &= \frac{1}{2} \|\overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{BC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{1^2 + 3^2 + 1^2} \\ &= \frac{\sqrt{11}}{2} \text{ u.a.} \end{aligned}$$

Exercice 61

On considère la droite $d : \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = t + 1 \\ z = 2 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

- 1) Justifier que le point $A(1; 0; 1)$ n'appartient pas à d .
- 2) R est le plan passant par A et contenant d . Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal au plan R .

$$1) A \in d \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} \mid \begin{cases} 1 = 2t - 1 \\ 0 = t + 1 \\ 1 = 2 \end{cases} \quad \text{impossible!}$$

Donc $A \notin d$

2) $B(-1; 1; 2) \in d$, donc $B \in R$

$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d .

Comme $A \notin d$, alors \vec{AB} et \vec{u} ne sont pas colinéaires

Donc $\vec{AB} \wedge \vec{u}$ est un vecteur normal à R

$$\begin{aligned} \vec{AB} & \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \vec{AB} \wedge \vec{u} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} (1 \cdot 0 - 1 \cdot 1) - \vec{j} (-2 \cdot 0 - 1 \cdot 2) - \vec{k} (-2 \cdot 1 - 1 \cdot 2) \\ &= -\vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k} \\ &= \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc $\vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à R .

Exercice 62

On considère les deux plans :

$$P_1 : x - y - z = 0$$

$$P_2 : 2x - y + z = 0$$

Déterminer une équation du plan P_3 passant par l'origine du repère et contenant la droite d'intersection des plans P_1 et P_2 .

$$M(x, y, z) \in P_1 \cap P_2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-y-2=0 & \textcircled{1} \\ 2x-y+z=0 & \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} : x = y + 2$$

$$\text{Dans } \textcircled{2} : 2(x+y) - y + z = 0 \Leftrightarrow 2y + 4 - y + z = 0 \\ \Leftrightarrow z = -y - 4$$

Posons : $y = t$, $t \in \mathbb{R}$, alors

$$P_1 \cap P_2 \equiv \begin{cases} x = t + 2 \\ y = t \\ z = -t - 4 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de cette droite, donc aussi de P_3 .

$A(2; 0; -4)$ appartient à cette droite, donc aussi à P_3 .

$$O \in P_1 \cap P_2 \quad \begin{cases} 0 = t + 2 \\ 0 = t \\ 0 = -t - 4 \end{cases} \quad \text{n'admet pas de solution}$$

Donc O n'appartient pas à cette droite. \vec{OA} et \vec{u} ne sont pas colinéaires. \vec{OA} et \vec{u} sont des vecteurs directeurs de P_3 et $\vec{OA} \wedge \vec{u}$ est un vecteur normal à P_3 .

$$\vec{OA} \wedge \vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i}(0 \cdot (-1) - (-4) \cdot 1) - \vec{j}(2 \cdot (-1) - (-4) \cdot 1) + \vec{k}(2 \cdot 1 - 0 \cdot 1) \\ = 4\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k} \\ = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Donc $\vec{OA} \wedge \vec{u}$ est un vecteur normal du P_3 . Soit $\vec{OA} \wedge \vec{u} = \vec{n}_3$.

Soit $M(x; y; z) \in \mathcal{P}_3$, donc :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}_3 = 0 &\Leftrightarrow (x-2) \cdot 4 + (y-0) \cdot (-2) + (z+4) \cdot 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow 4x - 8 - 2y + 2z + 8 = 0 \quad | \cdot \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow 2x - y + z = 0\end{aligned}$$

Exercice 63

On donne les quatre points $A(1; 0; -1)$, $B(-3; 2; 1)$, $C(-1; 2; 3)$ et $D(3; 0; 2)$.

- 1) Vérifier que les points A , B et C définissent un plan.
- 2) Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) .
- 3) Vérifier que le point D n'appartient pas au plan (ABC) .
- 4) Déterminer une représentation paramétrique de la droite d passant par D et perpendiculaire à (ABC) .
- 5) Déterminer les coordonnées du point d'intersection H de cette droite d et du plan (ABC) . En déduire la distance du point D au plan (ABC) .

1) vecteur directeur de (AB) : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

vecteur directeur de (AC) : $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

colinéaire ?

(AB) et (AC) sont colinéaires $\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} \mid \overrightarrow{AB} = k \cdot \overrightarrow{AC}$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} \mid \begin{cases} -4 = k \cdot (-2) & \textcircled{1} \\ 2 = k \cdot 2 & \textcircled{2} \\ 2 = k \cdot 4 & \textcircled{3} \end{cases}$$

$\textcircled{1} \Leftrightarrow k = 2$

Dans $\textcircled{2}$ $2 \neq 2 \cdot 2 = 4$

\overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} ne sont pas colinéaires, A , B et C définissent donc un plan (ABC) .

2) Comme $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est un vecteur normal de (ABC)

$$\begin{aligned}\vec{AB} \wedge \vec{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -4 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (2 \cdot 4 - 2 \cdot 2) \vec{i} - (-4 \cdot 4 + 2 \cdot 2) \vec{j} + (-4 \cdot 2 + 2 \cdot 2) \vec{k} \\ &= 4 \vec{i} + 12 \vec{j} - 4 \vec{k} \\ &= \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -4 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$\vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -4 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal de (ABC) .

$$(ABC): 4x + 12y - 4z + d = 0, \quad d \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned}\text{Comme: } A \in (ABC) &\Leftrightarrow 4 \cdot 1 + 12 \cdot 0 - 4 \cdot (-1) = d \\ &\Leftrightarrow d = 8\end{aligned}$$


$$\text{Donc } (ABC) \equiv 4x + 12y - 4z + 8 = 0$$

$$\begin{aligned}3) \quad d \in (ABC) &\Leftrightarrow 4 \cdot 3 + 12 \cdot 0 - 4 \cdot 2 + 8 \stackrel{?}{=} 0 \\ &\Leftrightarrow 4 \neq 0!\end{aligned}$$

Donc $d \notin (ABC)$

4) $\vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -4 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d .

$$d \equiv \begin{cases} x = 4t + 3 \\ y = 12t \\ z = -4t + 2 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$



5)

$$H(x, y, z) \in (ABC) \cap d$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 12y - 4z - 8 = 0 & \textcircled{1} \\ x = 3 + 4t & \textcircled{2} \\ y = 12t & \textcircled{3} \\ z = 2 - 4t & \textcircled{4} \end{cases}$$

②, ③ et ④ dans ① :

$$4(3+4t) + 12 \cdot 12t - 4(2-4t) - 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{1}{44}$$

$$\text{Dans } \textcircled{2} : x = 3 + 4 \cdot \frac{1}{44} = \frac{34}{11}$$

$$\text{Dans } \textcircled{3} : y = 12 \cdot \frac{1}{44} = \frac{3}{11}$$

$$\text{Dans } \textcircled{4} : z = 2 - 4 \cdot \frac{1}{44} = \frac{21}{11}$$

$$\text{Donc } H\left(\frac{34}{11}; \frac{3}{11}; \frac{21}{11}\right)$$

$$\text{dist}(D; (ABC)) = \|\overrightarrow{DH}\|$$

$$= \sqrt{\left(\frac{34}{11}\right)^2 + \left(\frac{3}{11}\right)^2 + \left(\frac{21}{11}\right)^2}$$

$$= \frac{\sqrt{11}}{11}$$

Exercice 64

On donne les points $A(1; -1; 2)$ et $B(2; 0; 4)$ et le plan $P : 2x - 3y + z - 1 = 0$.

- 1) Vérifier que la droite (AB) n'est pas perpendiculaire au plan P .
- 2) Déterminer un vecteur normal au plan noté Q qui contient la droite (AB) et qui est perpendiculaire à P .
- 3) Déterminer une équation cartésienne de ce plan Q .

$$1) \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ est un vecteur directeur de } (AB)$$

$$\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ est un vecteur normal à } P$$

\overrightarrow{AB} et \vec{n} ne sont pas colinéaires, donc (AB) n'est pas perpendiculaire à P .

2) Le plan Q contient (AB) et est perpendiculaire à P , donc Q est dirigé par les vecteurs non colinéaires \overrightarrow{AB} et \vec{n}

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \wedge \vec{n} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i}(1 \cdot 1 - 2 \cdot (-3)) - \vec{j}(1 \cdot 1 - 2 \cdot 2) + \vec{k}(1 \cdot (-3) - 1 \cdot 2) \\ &= 7\vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k} \\ &= \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Donc $\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à Q .

3) Q admet une équation cartésienne de la forme :

$$7x + 3y - 5z + d = 0, \quad d \in \mathbb{R}$$

$$A \in Q \Leftrightarrow 7 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) - 5 \cdot 2 + d = 0$$

$$\Leftrightarrow d = 6$$

$$\text{D'où } Q \equiv 7x + 3y - 5z + 6 = 0$$

Exercice 65

On donne les points $A(1; 1; 1)$ et $B(2; -1; 0)$ et le plan $P : x - y + 3z - 4 = 0$.

1) Vérifier que la droite (AB) n'est pas perpendiculaire au plan P .

2) Déterminer un vecteur normal du plan qui est perpendiculaire à P et qui contient les points A et B .

$$1) \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ est un vecteur directeur de } (AB)$$

$\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à P .

\vec{AB} et \vec{n} ne sont pas colinéaires, donc (AB) n'est pas perpendiculaire à P .

$$\begin{aligned} 2) \quad \vec{AB} \wedge \vec{n} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= ((-2) \cdot 3 - (-1) \cdot (-1)) \vec{i} - (1 \cdot 3 + 1 \cdot 1) \vec{j} + (1 \cdot (-1) - 1 \cdot (-2)) \vec{k} \\ &= -7 \vec{i} - 4 \vec{j} + \vec{k} \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \vec{AB} \wedge \vec{n} = \begin{pmatrix} -7 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 66 (examen mai 2014)

On donne les points $A(1; 2; 3)$ et $B(-1; 3; 5)$ et le plan $P : 2x + y - z + 3 = 0$.

- 1) Vérifier que la droite (AB) n'est pas perpendiculaire au plan P .
- 2) Déterminer un vecteur normal au plan noté Q qui contient la droite (AB) et qui est perpendiculaire à P .
- 3) Déterminer une équation cartésienne de ce plan Q .

$$1) \quad \vec{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ est un vecteur directeur de } (AB)$$

$$\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ est un vecteur normal à } P.$$

\vec{AB} et \vec{n} ne sont pas colinéaires, donc (AB) n'est pas perpendiculaire à P .

$$\begin{aligned}
 2) \quad \overrightarrow{AB} \wedge \vec{n} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\
 &= \vec{i} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= \vec{i} (1 \cdot (-1) - 1 \cdot 2) - \vec{j} (2 \cdot 1 - 2 \cdot 2) + \vec{k} (-2 \cdot 1 - 2 \cdot 1) \\
 &= \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \overrightarrow{AB} \wedge \vec{n} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

3) \mathcal{Q} admet une équation cartésienne de la forme :

$$\mathcal{Q} \equiv -3x + 2y - 4z + d = 0, \quad d \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned}
 A \in \mathcal{Q} &\Leftrightarrow -3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 - 4 \cdot 3 + d = 0 \\
 &\Leftrightarrow d = 11
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \mathcal{Q} \equiv -3x + 2y - 4z + 11 = 0$$

Exercice 67 (examen mai 2014)

On donne les quatre points $A(1; -3; 2)$, $B(2; -1; 1)$, $C(1; -2; 4)$ et $D(3; -2; 5)$.

- 1) Vérifier que les points A , B et C définissent un plan.
- 2) Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) .
- 3) Calculer l'aire du triangle ABC .
- 4) Vérifier que le point D n'appartient pas au plan (ABC) .
- 5) Déterminer une représentation paramétrique de la droite d passant par D et perpendiculaire à (ABC) .
- 6) Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de D sur le plan (ABC) .
- 7) En déduire la distance du point D au plan (ABC) .

$$1) \vec{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} ; \vec{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{AB} \neq k \cdot \vec{AC}, k \in \mathbb{R}$$

\vec{AB} et \vec{AC} ne sont pas colinéaires, donc A, B et C ne sont pas alignés et ces 3 points définissent un plan.

2) $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est un vecteur normal à (ABC)

$$\begin{aligned} \vec{AB} \wedge \vec{AC} &= \vec{i} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 5\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(ABC) admet alors une équation cartésienne de la forme

$$5x - 2y + z + d = 0, d \in \mathbb{R}$$

$$A \in (ABC) \Leftrightarrow 5 \cdot 1 - 2 \cdot (-3) + 2 + d = 0$$

$$\Leftrightarrow d = -13$$

$$\text{D'où } (ABC) \equiv 5x - 2y + z - 13 = 0$$

$$3) \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{5^2 + 2^2 + 1^2}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{30}$$

4) $D \in (ABC)$?

$$5 \cdot 3 - 2 \cdot (-2) + 5 - 13 = 11 (\neq 0)$$

$D \notin (ABC)$

5) $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est un vecteur directeur de d , d'où :

$$d \equiv \begin{cases} x = 5t + 3 \\ y = -2t - 2 \\ z = t + 5 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$6) (ABC) \cap d = \{H\}$$

$$M(x; y; z) \in (ABC) \cap d \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5t + 3 & \textcircled{1} \\ y = -2t - 2 & \textcircled{2} \\ z = t + 5 & \textcircled{3} \\ 5x - 2y + z - 13 = 0 & \textcircled{4} \end{cases}$$

①, ② et ③ dans ④:

$$5(5t + 3) - 2(-2t - 2) + t + 5 - 13 = 0$$

$$\Leftrightarrow t = -\frac{11}{30}$$

$$\text{D'où : } \begin{cases} x = 5 \cdot \left(-\frac{11}{30}\right) + 3 = \frac{7}{6} \\ y = -2 \cdot \left(-\frac{11}{30}\right) - 2 = -\frac{19}{15} \\ z = -\frac{11}{30} + 5 = \frac{139}{30} \end{cases}$$

$$\text{Donc : } H\left(\frac{7}{6}; -\frac{19}{15}; \frac{139}{30}\right)$$

$$7) \|\vec{DH}\| = \sqrt{\left(-\frac{11}{9}\right)^2 + \left(\frac{11}{15}\right)^2 + \left(-\frac{11}{6}\right)^2}$$

$$= \frac{11\sqrt{30}}{30}$$

La distance est $\frac{11\sqrt{30}}{30}$ u.l.