

Exercices : 110

111

112

113

117

118

119

Exercice 110

Résoudre dans \mathbb{R} les équations suivantes :

1 $\ln(4 - 2x) = \ln(x - 1)$

3 $2(\ln x)^2 - 5 \ln x - 3 = 0$

2 $\ln(2x^2 - 10x + 8) = \ln(3x^2 - 3x - 18)$

4 $(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$

1 C.E. $4 - 2x > 0$ et $x - 1 > 0$

$$\Leftrightarrow x < 2 \text{ et } x > 1$$

$$D_f =]1, 2[$$

$\forall x \in D_f : \ln(4 - 2x) = \ln(x - 1) \Leftrightarrow 4 - 2x = x - 1$

$$\Leftrightarrow 3x = 5$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{5}{3} \quad (\in D_f)$$

$$S = \left\{ \frac{5}{3} \right\}$$

2 C.E.: $2x^2 - 10x + 8 > 0$ et $3x^2 - 3x - 18 > 0$

$$\Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 > 0 \text{ et } x^2 - x - 6 > 0$$

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 \\ &= 9 \quad (= 3^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) \\ &= 25 \quad (= 5^2) \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} = \frac{5 - 3}{2} = 1$$

$$x_1 = \frac{1 - 5}{2} = -2$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} = \frac{5 + 3}{2} = 4$$

$$x_2 = \frac{1 + 5}{2} = 3$$

Forme factorisée:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Donc:

$$\Leftrightarrow (x - 1)(x - 4) > 0 \text{ et } (x + 2)(x - 3) > 0$$

T.d.S:	-∞	1	4	+∞	-∞	-2	3	+∞
$(x-1)(x-4)$	+	0	-0	+	$(x+2)(x-3)$	+	0	-0

$$I_1 =]-\infty; 1[\cup]4; +\infty[\quad I_2 =]-\infty; -2[\cup]3; +\infty[$$

$$D_f = I_1 \cap I_2 =]-\infty; -2[\cup]4; +\infty[$$

$\forall x \in D_f$:

$$\ln(2x^2 - 10x + 8) = \ln(3x^2 - 3x - 18) \Leftrightarrow 2x^2 - 3x^2 - 10x + 3x + 8 + 18 = 0 \\ \Leftrightarrow -x^2 - 7x + 26 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \\ = (-7)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 26 \\ = 153$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} = \frac{7 - \sqrt{153}}{-2} \approx 2,684 \dots (\notin D_f)$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} = \frac{7 + \sqrt{153}}{-2} \approx -9,684 \dots (\in D_f)$$

$$S = \left\{ \frac{7 + \sqrt{153}}{-2} \right\}$$

3 C.E.: $x > 0$

$$D_f = \mathbb{R}_+^*$$

$$\forall x \in D_f: 2(\ln(x))^2 - 5(\ln(x)) - 3 = 0$$

CHANGEMENT DE VARIABLE

$$\text{Posons: } \ln(x) = t$$

$$2t^2 - 5t^2 - 3 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \\ = 5^2 + 4 \cdot 2 \cdot 3 \\ = 49 (= 7^2) \quad (\text{deux solutions réelles})$$

$$t_1 = \frac{5 - 7}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{2}$$

$$t_2 = \frac{5+7}{2 \cdot 2} = 3$$

Comme $t = \ln(x)$: $\ln(x) = 3$ ou $\ln(x) = -\frac{1}{2}$
 $\Leftrightarrow x = e^3$ ou $x = e^{-\frac{1}{2}}$
 $\in D_f$ $\in D_f$

$$S = \left\{ e^{-\frac{1}{2}}; e^3 \right\}$$

4

C.E.: $x > 0$

$$D_f = \mathbb{R}_+^*$$

$$\ln(x)^2 - 3\ln(x) + 2 = 0$$

CHANGEMENT DE VARIABLE

Possons: $t = \ln(x)$

$$t^2 - 3t + 2 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$= 9 - 4 \cdot 1 \cdot 2$$

$$= 1 \quad (> 0) \quad (\text{deux solutions dans } \mathbb{R})$$

$$t_1 = \frac{3-1}{2 \cdot 1} = 1$$

$$t_2 = \frac{3+1}{2 \cdot 1} = 2$$

Comme $t = \ln(x)$: $\ln(x) = 1$ ou $\ln(x) = 2$
 $\Leftrightarrow x = e$ ou $x = e^2$
 $\in D_f$ $\in D_f$

$$S = \left\{ e; e^2 \right\}$$

Exercice 111

Résoudre dans \mathbb{R} les équations suivantes :

1 $\ln(x^2 - 1) = \ln(3)$

2 $\ln(4x + 3) - \ln(3x) = 0$

3 $\ln(x^3 + 8x^2) = \ln(5x + 84)$

4 $\ln\sqrt{7x+3} - \ln(5x + 1) = 0$

1 E.E. : $x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow x^2 > 1$
 $\Leftrightarrow x > 1 \text{ ou } x < -1$

$D =]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$

$\forall x \in D$: $\ln(x^2 - 1) = \ln(3) \Leftrightarrow x^2 - 1 = 3$
 $\Leftrightarrow x^2 = 4$
 $\Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -2$

$S = \{-2; 2\}$

2 C.E. : $4x + 3 > 0 \text{ et } 3x > 0$

$\Leftrightarrow x > -\frac{3}{4} \text{ et } x > 0$

$D = \mathbb{R}_+^*$

$\forall x \in D$: $\ln(4x + 3) - \ln(3x) = 0 \Leftrightarrow 4x + 3 = 3x$
 $\Leftrightarrow x = -3 \quad (\notin D_p)$

$S = \emptyset$

3 C.E. : $x^3 + 8x^2 > 0 \text{ et } 5x + 84 > 0$

$\Leftrightarrow x^2(x + 8) > 0 \text{ et } x > -\frac{84}{5}$

$\Leftrightarrow x \neq 0 \text{ ou } x > -8 \text{ et } x > -\frac{84}{5} = -16,8$

$D =]-8; 0[\cup]0; +\infty[$

$\forall x \in D$: $\ln(x^3 + 8x^2) = \ln(5x + 84) \Leftrightarrow x^3 + 8x^2 = 5x + 84$

$$\Leftrightarrow x^3 + 8x^2 - 5x - 84 = 0$$

$$\text{Soit: } P(x) = x^3 + 8x^2 - 5x - 84 = 0$$

Schéma de Horner:

Comme $P(x)=0$

	1	8	-5	-84
3		3	33	84
	1	11	28	0

$$\text{Donc: } P(x) = (x-3)(x^2+11x+28)$$

$$D = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$= 121 - 4 \cdot 1 \cdot 28$$

$$= 9 \quad (= 3^2) \quad (\text{deux solutions dans } \mathbb{R})$$

$$x_1 = \frac{-11-3}{2 \cdot 1} = -7 \quad (\in D)$$

$$x_2 = \frac{-11+3}{2 \cdot 1} = -4 \quad (\in D)$$

$$\text{et } x_3 = 3 \quad (\in D)$$

$$S = \{-7; -4; 3\}$$

$$\boxed{4} \quad \ln(\sqrt{7x+3}) = \ln(5x+1) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \ln(7x+3) = \ln(5x+1) \quad \textcircled{*}$$

$$\text{C.E.: } 7x+3 > 0 \quad \text{et} \quad 5x+1 > 0$$

$$\Leftrightarrow x > -\frac{3}{7} \quad \text{et} \quad x > -\frac{1}{5}$$

$$D = \left] -\frac{1}{5}; +\infty \right[$$

$$\nexists x \in D: \quad \textcircled{*} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \ln(7x+3) = \ln(5x+1)$$

$$\Leftrightarrow 7x+3 = (5x+1)^2$$

$$\Leftrightarrow 7x+3 = 25x^2 + 10x + 1$$

$$\Leftrightarrow 25x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$= 9 - 4 \cdot 25 \cdot (-2)$$

$= 209 (> 0)$ deux solutions dans \mathbb{R}

$$x_1 = \frac{-3 - \sqrt{209}}{50} = -0,349\dots (\notin D)$$

$$x_2 = \frac{-3 + \sqrt{209}}{50} = 0,229\dots (ED)$$

$$S = \left\{ \frac{-3 + \sqrt{209}}{50} \right\}$$

Exercice 112

Résoudre dans \mathbb{R} les équations suivantes :

1 $\ln(x+1) + \ln(4x-1) = \ln(2x+1)$

2 $\ln(x) + \ln(x^2 - 9) = \ln(4) + \ln(x+3)$

3 $\ln(x) + \ln(x^2 + 5x - 2) = \ln(2) + \ln(5)$

1 C.E.: $x+1 > 0$ et $4x-1 > 0$ et $2x+1 > 0$

$$\Leftrightarrow x > -1 \text{ et } x > \frac{1}{4} \text{ et } x > -\frac{1}{2}$$

$$D = \left] \frac{1}{4}; +\infty \right[$$

$\forall x \in D$: $\ln(x+1) + \ln(4x-1) = \ln(2x+1)$

$$\Leftrightarrow \ln[(x+1)(4x-1)] = \ln(2x+1)$$

$$\Leftrightarrow (x+1)(4x-1) = (2x+1)$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - x + 4x - 1 = 2x + 1$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 + x - 2 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$= 1^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-2)$$

$= 33 (> 0)$ deux solutions dans \mathbb{R}

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{33}}{8} < 0 \quad (\notin D) \quad ; \quad x_2 = \frac{-1 + \sqrt{33}}{8} \approx 0,6 \quad (\in D)$$

$$S = \left\{ \frac{-1 + \sqrt{33}}{8} \right\}$$

2 C.E.: $x > 0$ et $x^2 - 9 > 0$ et $x+3 > 0$

$\Leftrightarrow x > 0$ et $x > 3$ ou $x < -3$ et $x > -3$

$$D =]3; +\infty[$$

$$\forall x \in D: \ln(x) + \ln(x^2 - 9) = \ln(4) + \ln(x+3)$$

$$\Leftrightarrow \ln[x(x^2 - 9)] = \ln[4(x+3)]$$

$$\Leftrightarrow x(x^2 - 9) = 4(x+3)$$

$$\Leftrightarrow x(x+3)(x-3) = 4(x+3)$$

$$\Leftrightarrow (x+3)[x(x-3) - 4] = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -3 \text{ ou } x(x-3) - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -3 \text{ ou } x^2 - 3x - 4 = 0$$

(ED)

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$= 9 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)$$

$= 25 (> 0)$ deux solutions dans \mathbb{R}

$$x_1 = \frac{3-5}{2} = -1 \quad (\in D)$$

$$x_2 = \frac{3+5}{2} = 4$$

$$S = \{4\}$$

3 C.E.: $x > 0$ et $x^2 + 5x - 2 > 0$

$$\Delta = 5^2 + 4 \cdot 1 \cdot 2$$

$= 33 (> 0)$ deux solutions dans \mathbb{R}

$$x_1 = \frac{-5 - \sqrt{33}}{2} = -5,372\dots$$

$$x_2 = \frac{-5 + \sqrt{33}}{2} = 0,372\dots$$

$$D =]x_2; +\infty[=]\frac{-5 + \sqrt{33}}{2}; +\infty[$$

$x \in D$:

$$\ln(x) + \ln(x^2 + 5x + 2) = \ln(2) + \ln(5) \Leftrightarrow \ln[x(x^2 + 5x + 2)] = \ln(10)$$

$$\Leftrightarrow x^3 + 5x^2 + 2x - 10 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2(x+5) - 2(x+5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+5)(x^2-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -5 \text{ ou } x^2 = 2$$

$$\Leftrightarrow x = -5 \text{ ou } x = -\sqrt{2} \text{ ou } x = \sqrt{2}$$

($\notin D$) ($\notin D$) ($\in D$)

$$S = \{\sqrt{2}\}$$

Exercice 113

Résoudre dans \mathbb{R} les équations suivantes :

1 $\ln \sqrt{2x-1} + \ln \sqrt{x+1} = \ln(x+4)$

3 $\ln \sqrt{4x-1} - \ln \sqrt{x^2-25} = \ln 2$

2 $\ln \frac{x}{x+7} = \ln \frac{x-3}{x+2}$

4 $\ln \sqrt{\frac{x-2}{x+6}} = \ln 3 + \ln \sqrt{x}$

1 $2x-1 > 0 \text{ et } x+1 > 0 \text{ et } x+4 > 0$

$\Leftrightarrow x > \frac{1}{2} \text{ et } x > -1 \text{ et } x > -4$

$$D = \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$$

$\forall x \in D:$ $\frac{1}{2} \ln(2x-1) + \frac{1}{2} \ln(x+1) = \ln(x+4)$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \left\{ \ln[(2x-1)(x+1)] \right\} = \ln(x+4)$$

$$\Leftrightarrow (2x-1)(x+1) = (x+4)^2$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 2x - x - 1 = x^2 + 8x + 16$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 7x - 17 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$= 49 + 4 \cdot 1 \cdot 17$$

= 117 (> 0) deux solutions dans \mathbb{R}

$$= 3\sqrt{13}$$

$$x_1 = \frac{7 - 3\sqrt{13}}{2} = -1,908\dots \quad (\notin D)$$

$$x_2 = \frac{7 + 3\sqrt{13}}{2} = 8,908\dots \quad (\in D)$$

$$S = \left\{ \frac{7 + 3\sqrt{13}}{2} \right\}$$

2 C.E.: $\frac{x}{x+7} > 0$ et $\frac{x-3}{x+2} > 0$

T.d.s.

	$-\infty$	-7	0	$+\infty$
x	-	-	0	+
$x+7$	-	0	+	
$\frac{x}{x+7}$	+		-	0

T.d.s

	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$x-3$	-	-	0	+
$x+2$	-	0	+	
$\frac{x-3}{x+2}$	+		-	0

$$I_1 =]-\infty; -7[\cup [0; +\infty[$$

$$I_2 =]-\infty; -2[\cup [3; +\infty[$$

$$D = I_1 \cap I_2 =]-\infty; -7] \cup [3; +\infty[$$

$\forall x \in D$: $\ln\left(\frac{x}{x+7}\right) = \ln\left(\frac{x-3}{x+2}\right) \Leftrightarrow x(x+2) = (x-3)(x+7)$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x = \cancel{x^2 + 7x} - 3x - 21$$

$$\Leftrightarrow -2x + 21 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{21}{2} \quad (\in D)$$

$$S = \left\{ \frac{21}{2} \right\}$$

3 C.E.: $4x-1 > 0$ et $x^2 - 25 > 0$

$$\Leftrightarrow x > \frac{1}{4}$$
 et $x > 5$ ou $x < -5$

$$D =]5; +\infty[$$

$\forall x \in D$: $\ln(\sqrt{4x-1}) - \ln(\sqrt{x^2-25}) = \ln(2)$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\sqrt{\frac{4x-1}{x^2-25}}\right) = \ln(2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{4x-1}{x^2-25} = 4$$

$$\Leftrightarrow 4x-1 = 4x^2 - 100$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 4x - 99 = 0$$

$$\Delta = 4^2 + 4 \cdot 4 \cdot 99$$

$$= 1600 (> 0) \quad \text{deux solutions dans } \mathbb{R}$$

$$= 40^2$$

$$x_1 = \frac{4-40}{8} = -\frac{9}{2} \quad (\notin D)$$

$$x_2 = \frac{4+40}{8} = \frac{11}{2} \quad (\in D)$$

$$S = \left\{ \frac{11}{2} \right\}$$

$$4 \quad C.E. \quad \frac{x-2}{x+6} > 0 \quad \text{et} \quad x > 0$$

T.d.S:

	$-\infty$	-6	2	$+\infty$
$x-2$	-	-	0	+
$x+6$	-	0	+	+
$\frac{x-2}{x+6}$	+		-	$\underbrace{0}_{D} +$

$$D =]2; +\infty[$$

$$\forall x \in D: \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x-2}{x+6} \right) = \ln(3) + \ln(\sqrt{x})$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x-2}{x+6} \right) = \ln(3\sqrt{x})$$

$$\Leftrightarrow \cancel{\frac{1}{2} \ln} \left(\frac{x-2}{x+6} \right) = \cancel{\frac{1}{2} \ln} (3x)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x-2}{x+6} = 3x$$

$$\Leftrightarrow x-2 = 3x(x+6)$$

$$\Leftrightarrow x-2 = 3x^2 + 54x$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 + 53x + 2 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= 53^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2$$

= 2737 (> 0) deux solutions dans \mathbb{R}

$$x_1 = \frac{-53 - \sqrt{2737}}{18} = -5,85 \dots (\notin D)$$

$$x_2 = \frac{-53 + \sqrt{2737}}{18} = -0,037 \dots (\notin D)$$

$$S = \emptyset$$

Exercice 117

Résoudre dans \mathbb{R} :

1 $6(\ln x)^2 + 7\ln x - 3 = 0$

2 $(\ln x)^3 - 2(\ln x)^2 - \ln x + 2 = 0$

3 $2[\ln(2x)]^2 - 5\ln(2x) - 3 \leq 0$

4 $(\ln x)^2 + 2\ln x - 15 > 0$

1 $6[\ln(x)]^2 + 7\ln(x) - 3 = 0$

CHANGEMENT DE VARIABLE

Posons $\ln(x) = N$

$$6N^2 + 7N - 3 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= 7^2 - 4 \cdot 6 \cdot (-3)$$

$$= 122 \quad (= N^2)$$

$$N_1 = \frac{-7 - \sqrt{122}}{2 \cdot 6} = -\frac{3}{2}$$

$$N_2 = \frac{-7 + \sqrt{122}}{2 \cdot 6} = \frac{1}{3}$$

Donc : $\ln(x) = -\frac{3}{2}$ et $\ln(x) = \frac{1}{3}$

$$\Leftrightarrow x = e^{-\frac{3}{2}} \quad \text{et} \quad x = e^{\frac{1}{3}}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{e^{\frac{3}{2}}} \quad \text{et} \quad x = \sqrt[3]{e}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{e}}{e^2} \quad \text{et} \quad x = \sqrt[3]{e}$$

2 $[\ln(x)]^3 - 2[\ln(x)]^2 - \ln(x) + 2 = 0 \quad (= P)$

CHANGEMENT DE VARIABLE

Posons $\ln(x) = N$

Donc :

$$N^3 - 2N^2 - N + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow N^2(N-2) - (N-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (N^2-1)(N-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow N^2-1=0 \text{ ou } N-2=0$$

$$\Leftrightarrow N=1 \text{ ou } N=2 \text{ ou } N=-1$$

Comme $\ln(x)=N$, alors : $x=e$ ou $x=e^2$ ou $x=e^{-1}$

$$S = \left\{ \frac{1}{e}, e, e^2 \right\}$$

3 $2[\ln(2x)]^2 - 5\ln(2x) - 3 \leq 0$

CHANGEMENT DE VARIABLE

Posons : $\ln(2x) = N$

$$2N^2 - 5N - 3 \leq 0$$

$$\begin{aligned} D &= b^2 - 4ac \\ &= 25 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) \\ &= 49 \quad (= 7^2) \end{aligned}$$

$$N_1 = \frac{5-7}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{2}$$

$$N_2 = \frac{5+7}{2 \cdot 2} = 3$$

Comme $\ln(2x) = N$:

$$\begin{aligned} N_1 = \ln(2x) = -\frac{1}{2} &\Leftrightarrow 2x = e^{-\frac{1}{2}} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{2\sqrt{e}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_2 = \ln(2x) = 3 &\Leftrightarrow 2x = e^3 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{2}e^3 \end{aligned}$$

T.d.S

	$-\infty$	$\frac{1}{2e}$	$\frac{1}{2}e^3$	$+\infty$
P	+	0	- 0	+

$$x \leq 0 \Leftrightarrow \left] \frac{1}{2e}; \frac{1}{2}e^3 \right[$$

4 $[\ln|x|]^2 + 2\ln|x| - 15 > 0$

CHANGEMENT DE VARIABLE

Parsons: $\ln(x) = V$

$$V^2 + 2V - 15 > 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15)$$

$$= 64$$

=

$$V_1 = \frac{-2 - 8}{2 \cdot 1} = -5$$

$$V_2 = \frac{-2 + 8}{2 \cdot 1} = 3$$

Comme $V = \ln(x)$: $\ln(x) = -5$ ou $\ln(x) = 3$

$$\Leftrightarrow x = e^{-5} \text{ ou } x = e^3$$

T.d.S:

	$-\infty$	e^{-5}	e^3	$+\infty$
$[\ln(x)]^2 + 2\ln(x) - 15$	+	0	- 0	+

$$S =]-\infty; e^{-5}] \cup [e^3; +\infty[$$

Exercice 118

Résoudre dans \mathbb{R} :

1 $e^{x-1} < 2$

3 $e \frac{x+1}{x} > 3$

2 $(e^x + 1)(e^x - 4) \leq 0$

4 $\frac{1}{2} \leq e^x \leq 2$

$$\begin{aligned} \boxed{1} \quad e^{x-1} &< 2 \Leftrightarrow x-1 < \ln(2) \\ &\Leftrightarrow x < \ln(2) - 1 \\ S &=]-\infty ; \ln(2) - 1[\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \boxed{2} \quad \underbrace{(e^x + 1)}_{> 0} (e^x - 4) &\leq 0 \\ \Rightarrow e^x - 4 &\leq 0 \Leftrightarrow e^x \leq 4 \\ &\Leftrightarrow x \leq \ln(4) \end{aligned}$$

T.d.S:	-\infty	$\ln(4)$	$+\infty$
$e^x - 4$	-	0	+

$$S =]-\infty ; \ln(4)[$$

3 $\forall x \in \mathbb{R}^*$:

$$e^{\frac{x+1}{x}} > 3 \Leftrightarrow \frac{x+1}{x} > \ln(3)$$

\Leftrightarrow

$$\begin{aligned} \boxed{4} \quad \frac{1}{2} \leq e^x \leq 2 &\Leftrightarrow \ln\left(\frac{1}{2}\right) \leq x \leq \ln(2) \\ &\Leftrightarrow -\ln(2) \leq x \leq \ln(2) \\ S &= [-\ln(2) ; \ln(2)] \end{aligned}$$

Exercice 119

Résoudre dans \mathbb{R} :

$$1 \quad (x-1)e^{\ln(2x+3)} = x \ln(e^{4x+1})$$

$$2 \quad e^{\ln \frac{x+1}{x-3}} < \ln e^{-5x}$$

$$3 \quad \ln \frac{e^{6x-1}}{e^{9x+2}} = x \ln e^{1-3x}$$

$$4 \quad e^{2 \ln(4x+5)} > \ln e^{(7x+3)^2}$$

$$1 \quad (x-1) e^{\ln(2x+3)} = x \ln(e^{4x+1})$$

$$\text{C.E. } 2x+3 > 0 \quad \text{et} \quad e^{4x+1} > 0$$

$$\Leftrightarrow x > -\frac{3}{2}$$

\hookrightarrow Toujours vrai

$$D = \left] -\frac{3}{2}; +\infty \right[$$

$$\forall x \in D : (x-1) e^{\ln(2x+3)} = x \ln(e^{4x+1}) \Leftrightarrow (x-1)(2x+3) = x(4x+1)$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 3x - 2x - 3 = 4x^2 + x$$

$$\Leftrightarrow -2x^2 - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 = -\frac{3}{2}$$

impossible dans \mathbb{R}

$$S = \emptyset$$

$$2 \quad e^{\ln(\frac{x+1}{x-3})} < \ln(e^{-5x})$$

$$\text{C.E. } \frac{x+1}{x-3} > 0 \quad \text{et} \quad e^{-5x} > 0$$

\hookrightarrow Toujours vrai

T.d.S :

	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$x+1$	-	0	+	+
$x-3$	-	-	0	+
$\frac{x+1}{x-3}$	+	-		+

$$\text{Donc: } D = \left] -\infty; -1 \right[\cup \left] 3; +\infty \right[$$

$$= \mathbb{R} \setminus \left] -1; 3 \right[$$

$$\forall x \in D: e^{\ln\left(\frac{x+1}{x-3}\right)} < \ln(e^{-5x}) \Leftrightarrow \frac{x+1}{x-3} < -5x$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+1 + 5x(x-3)}{x-3} < 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+1 + 5x^2 - 15x}{x-3} < 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{5x^2 - 14x + 1}{x-3} < 0$$

Recherche des racines :

$$5x^2 - 14x + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= 196 - 4 \cdot 5 \cdot 1$$

= 176 (> 0) deux solutions réels

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} = \frac{14 - \sqrt{176}}{2 \cdot 5} = \frac{7 - 2\sqrt{11}}{5}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} = \frac{14 + \sqrt{176}}{2 \cdot 5} = \frac{7 + 2\sqrt{11}}{5}$$

T.d.S:

	$-\infty$	$\frac{7-2\sqrt{11}}{5}$	$\frac{7+2\sqrt{11}}{5}$	3	$+\infty$
$5x^2 - 14x + 1$	+	0	-	0	+
$x-3$	-	-	-	-	0+
$\frac{5x^2 - 14x + 1}{x-3}$	-	0	+	0	-

$\underbrace{}$

a exclure car $\notin D$

Finalement:

$$S =]-\infty; \frac{7+2\sqrt{11}}{5}[$$

3

$$\ln\left(\frac{e^{6x-1}}{e^{9x+2}}\right) = x \ln(e^{1-3x})$$

$$C.E.: \frac{e^{6x-1}}{e^{9x+2}} > 0 \text{ et } e^{1-3x} > 0$$

toujours vrai

$D = \mathbb{R}$

$$\forall x \in \mathbb{R}: \ln\left(\frac{e^{6x-1}}{e^{9x+2}}\right) = x \cdot \ln(e^{1-3x}) \Leftrightarrow \ln(e^{6x-1}) - \ln(e^{9x+2}) = x \cdot \ln(e^{1-3x})$$

$$\Leftrightarrow 6x-1 - 9x-2 = x-3x^2$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 4x - 3 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= 16 - 4 \cdot (-3) \cdot 3$$

= 52 (> 0) deux solutions réels

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} = \frac{4 - \sqrt{52}}{2 \cdot 3} = \frac{2 - \sqrt{13}}{3}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} = \frac{4 + \sqrt{52}}{2 \cdot 3} = \frac{2 + \sqrt{13}}{3}$$

$$\text{Donc: } S = \left\{ \frac{2 - \sqrt{13}}{3}, \frac{2 + \sqrt{13}}{3} \right\}$$

4) $e^{2\ln(4x+5)} > \ln(e^{(7x+3)^2})$

$$C.E.: 4x+5 > 0 \text{ et } e^{(7x+3)^2} > 0$$

$\Leftrightarrow x > -\frac{5}{4}$ *toujours vrai*

$$D = \left] -\frac{5}{4}; +\infty \right[$$

$$\forall x \in D: e^{2\ln(4x+5)} > \ln(e^{(7x+3)^2}) \Leftrightarrow e^{\ln[(4x+5)^2]} > \ln(e^{(7x+3)^2})$$

$$\Leftrightarrow (4x+5)^2 > (7x+3)^2$$

$$\Leftrightarrow 16x^2 + 40x + 25 > 49x^2 + 42x + 9$$

$$\Leftrightarrow -33x^2 - 2x + 16 > 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot ac$$

$$= 2^2 - 4 \cdot (-33) \cdot 16$$

= 2116 (> 0) deux solutions réels

$$= 46^2$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 - 46}{2 \cdot (-33)} = \frac{2}{3}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 + 46}{2 \cdot (-33)} = -\frac{8}{11}$$

T.d.S :

	$-\infty$	$-\frac{8}{11}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$-33x^2 - 2x + 16$	-	○	○	-

$$S = \left] -\frac{8}{11}; \frac{2}{3} \right[$$